vertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D.

EDITION GRANDES CULTURES



2 80.22.19.38 (

Bulletin nº 28 - 4 novembre 1987

COLZA

Charançon du bourgeon terminal : Ne pas traiter

BLE - ORGES D'HIVER

Pucerons: Peu de progression, surveiller

Limaces : Surveiller

SUR MINITEL

Vous pourrez aussi consulter les Avertissements Agricoles du S.R.P.V. Bourgogne



Pour obtenir les Avertissements télématiques
APPELEZ le 36-15
CODE EDIMK

COLZA

Evolution régulière de la végétation, conditions favorables aux parcelles dont les levées ont été retardées. Cependant l'hétérogénéité des stades se maintient.

- ALTISES

Confirmation de l'absence "quasi généralisée" de captures.

CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

- Absence de vol malgré les journées ensoleillées favorables aux arrivées de ces insectes sur les parcelles. Les captures sont très peu fréquentes : observées seulement dans 5 à 6 postes répartis dans toute la région Bourgogne Franche-Comté.
 - Les traitements insecticides ne sont pas justifiés.

— SECTIONNEMENT DE PIVOTS : Effet mécanique du vent

- Depuis le 20 octobre les symptômes suivants sont observés : des pivots le plus souvent partiellement sectionnés où ne subsiste que le cylindre central. Ces pieds se remarquent facilement car à la suite de difficultés d'alimentation ils rougissent. Certaines plantes essaient d'émettre de nouvelles racines.
- Ces symptômes sont surtout observés dans les semis faits à partir du 5-7 septembre donc surtout dans les situations de plaine: Côte-d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire.
- Le plus souvent la fréquence de pieds attaqués est faible, mais dans quelques parcelles elle est élevée, de l'ordre de 30 à 40 %.
- Ces sectionnements sont dûs à un effet mécanique du vent (très violent certaines journées de la deuxième décade d'octobre) sur des pieds partiellement déchaussés ou (et) dans des sols durcis, compactés (mauvaise préparation ou effets successifs des pluies et du vent).

P.1.42

ORGES D'HIVER BLE -

STADES:

Tous premiers semis

: début tallage

Semis début octobre

: 3 feuilles - 1 talle

Semis autour du 20 octobre : 1 à 2 feuilles

La part restant à emblaver reste parfois importante en sols humides.

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

SITUATION:

Malgré une très légère progression, on observe encore peu de pucerons dans les parcelles.

Sur l'ensemble des régions :

majorité des parcelles O % de pieds porteurs de pucerons quelques parcelles entre O % et 5 % de pieds porteurs de pucerons.

- Sur la plaine du Jura:

quelques rares parcelles entre 5 et 10 % de pieds porteurs de pucerons.

PRECONISATION:

La surveillance reste nécessaire tant que des conditions douces se maintiendront.

Le seuil de 10 à 15 % de pieds porteurs de pucerons ne sera vraisemblablement atteint que dans un petit nombre de situations.

Compte tenu de l'époque, en deçà de ce seuil, toute intervention insecticide est inutile.

LIMACES

On observe fréquemment une activité importante de ces ravgeurs, avant et après la levée. Surveiller les parcelles, en particulier les bordures avec talus, haies...

Intervenir le cas échéant avec une spécialité en granulés à base de mercaptodiméthur ou de métaldéhyde. Veiller à une répartition régulière des granulés.